Standardklärung Schule/ÜK 2019/20 (für BiVo 2010/2019)

ATMB

Themen	Umsetzung Schule/ÜK (in den Praxen gelten eigene Richtlinien)
Injektionen	Im Lehrmittel steht nichts zum Abstand Kanülenansatz zur Haut. Wir einigen uns: 1. Wahl der Kanülenlänge ist relevant, konstitutionell zum Patienten 2. Abstand Kanülenansatz zur Haut ist nur bei i./m. Injektion relevant mit einem Sicherheitsabstand von ca. 5 mm. Grund: Wenn die Kanüle abbrechen sollte, kann sie entfernt werden

Labor

Themen	Umsetzung Schule/ÜK (in den Praxen gelten eigene Richtlinien)
Hygiene im Labor	Vor Laboreintritt: Hände zuerst desinfizieren, dann waschen. • 1./2. Lehrjahr gemäss Evidenz neue Bivo: Zuerst Keimabtötung dann Reinigung. • 3. Lehrjahr: Hände waschen und desinfizieren gemäss Lehrmittel. Bei Laborausstritt: Hände zuerst desinfizieren, dann waschen.
BE-Röhrli	Folgende Varianten sind möglich: • BE-Röhrli vor Blutentnahme von Hand beschriften. Nach Blutentnahme mit Patient Personalien überprüfen und Etikette auf Röhrli kleben. • BE ohne Beschriftung durchführen. Nach Blutentnahme mit Patient Personalien überprüfen und Etikette auf Röhrli kleben.

Röntgen

Themen	Umsetzung Schule/ÜK (in den Praxen gelten eigene Richtlinien)
Standards	Die gleiche Fachsprache und Begrifflichkeiten werden sowohl in der Schule als auch im ÜK angewendet.